


SÅDAN LAVER JEG MIN CELLEBYGGER

Læs her, hvordan man kan lave en god og effektiv cellebygger. Betragt artiklen som en opskrift og lav dine egne erfaringer.



Af
dronningavler
Anders Glob,
Thorsager

At have unge livskraftige dronninger i sine bifamilier er en forudsætning for at få en god honninghøst.

Mange forsøger sig ud i dronningavlen med større eller mindre held. Især i år med dårligt vejr foretages der mange mislykkede forsøg. I flere år har jeg brugt en metode til opbygning af mine cellebyggere, som oprindeligt er udviklet af Broder Adam. Denne metode virker fra tidligt forår til sent efterår i al slags vejr.

Opbygning af cellebygger 14 dage før omlarvning. 2 stærke familier sættes ovenpå hinanden med dronninggitter imellem. Dronningen fjernes fra den øverste familie. Der fodres hver aften med 1/2 - 3/4 liter 40-45 % sukkervand.

5-6 døgn før omlarvning. Den øverste familie eftertes for nødceller (dronningceller). Eventuelle nødceller fjernes. Ryst bierne af tavlerne for ikke at overse små nødceller. Familien lades i ro yderligere 4-5 døgn. Der fodres fortsat.

Forberedelse før omlarvning. Kasserne tages af bundbrædtet og sættes ved siden af. Dronninggitteret lægges på bunden. Kasse 2

(den øverste familie) sættes på bunden med 6 yngeltavler og 2 pollentavler anbragt som vist på figuren. Fra kasse 1 tages dronningen sammen med den tavle, hun går på, og sættes i en kasse sammen med 1 pollentavle og et stykke Apifonda. Kassen anbringes et andet sted i bigården. Indskrænk flyvespalten. Samtlige bier fra kasse 1 rystes af foran kasse 2. Yngeltavlerne fra kasse 1 fordeles i andre bifamilier.

Cellebyggeren er nu klar til brug. Cellebyggeren skal nu stå i et par timer og falde til ro og er derefter klar til brug. Man kan give cellebyggeren 2 avlsrammer med 30 celler i hver. Når cellerne er lukkede på 5. dagen, kan de udskiftes med en ny omlarvning på 2 x 30 celler. Er cellebyggeren lavet korrekt og omlarvningen foretaget omhyggeligt, vil man kunne regne med at råde over 100-110 jomfrudronninger. Er der kun lidt eller ingen træk, skal cellebyggeren fodres med sukkervand. Når sidste hold celler er forseglet og fjernet fra cellebyggeren, kan man atter sætte den gamle dronning til, eller lade en celle blive og lade cellebyggeren udruge og sende

den nye dronning på paringsudflugt. □

Figur 1



Figur 2

Yngel
Yngel
Pollen
Avlsramme
Yngel
Yngel
Avlsramme
Pollen
Yngel
Yngel

Figur 3

